

Laparoskopik Burch Operasyonu; Eş Zamanlı Bilateral Tubal Ligasyon

MELTEM ÇALIŞKAN

OZAN KARADENİZ

ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ, İSTANBUL

GİRİŞ

- ▶ Üriner inkontinans kadınlar arasında sıkça görülen, kişisel ve toplumsal harcamalara neden olan bir sağlık sorunudur (1).
- ▶ Fiziksel efor ile birlikte istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanan stres üriner inkontinans ise Türkiye'deki kadınlarda % 39.8 sıklıkta görülmekte ve hayat kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir (2).
- ▶ Stres üriner inkontinans cerrahisinde uygulanan Burch kolposüspansiyonda inkontinansa neden olan üretral hipermobilitiyi düzeltmek için retropubik kolposüspansiyon ve üretropeksi yapılarak periüretral dokular yükseltilmekte ve güçlendirilmektedir.

OLGU

- ▶ Kliniğimize; 42 yaşında (G4 P3 A1), sterilizasyon istemi ve stres üriner inkontinans şikayetleri ile başvuran hastanın yapılan muayenesinde stres ve q-tip test pozitif olup tranvaginal ultrasonografik görüntülenmesinde birkaç adet 1 cm'lik subseröz myoma uteri dışında patolojik bulgu izlenmemesi üzerine operasyon kararı alındı. Laparoskopik bilateral tüp ligasyonu ve burch kolposüspansiyon ameliyatı uygulandı.



POSTOP

- ▶ İşlem sonrası komplikasyon izlenmedi.
- ▶ Post operatif birinci günde post rezidüel idrar miktarı 50 cc olarak tespit edildi. Spontan diürezinin normal ve gaz deşarjının olması üzerine hasta şifa ile taburcu edildi.
- ▶ Postoperatif takiplerinde (3. ay) hastanın idrar kaçırma şikayetlerinin azaldığı görüldü. Operasyonun uzun dönem sonuçları açısından hastanın kliniğimizde takibi devam etmektedir.



TEŞEKKÜRLER